

NOTA DE PREMSA 25.05.2010



Un estudi de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) estudia si introduir preguntes claus en les consultes de primària permet detectar violència domèstica i conèixer la seva prevalença entre les dones que van a les consultes.

UN 25% DE LES DONES QUE VAN A LES CONSULTES DE PRIMÀRIA PATEIXEN MALTRACTAMENT

Les preguntes claus són més eficients quan és la primera vegada que la dona es visita

L'estudi es va fer sobre 400 dones seleccionades aleatòriament que es visitaven a les consultes dels Centres d'Atenció Primària de Salut i d'Atenció a la Dona de Sant Boi del Llobregat (Barcelona). Es van excloure aquelles que es coneixia patien maltractament.

Es va crear un grup control on hi havia una pregunta directa referent a la violència domèstica, i un grup intervenció, on a més de la pregunta directa, es van incloure 6 preguntes claus: relació amb els seus pares, amb els de la parella, si la parella havia patit maltractament, relació amb la parella, si es consentien les relacions sexuals, i si la parella s'enfadava quan no es volien tenir relacions sexuals.

Si la pacient contestava que "sí" a la pregunta sobre violència domèstica, o es detectava violència domèstica a partir de les preguntes indirectes, s'omplia un qüestionari final per valorar: quin tipus de violència domèstica presentava, si es generalitzava a altres membres de la família, qui la realitzava, quan de temps feia que patia maltractament, i si s'havia denunciat. En aquests casos es tornava a citar a la dona o se li oferien els diferents recursos ja siguin socials, psicològics o legals que la pacient necessitava i disponibles al municipi.

Resultats

Es detecta un 25% de prevalença del maltractament, entre aquestes dones un 78% diu tenir una bona relació amb la seva parella, i un 42.6% expressa que el maltractament s'entén a altres membres de la família.

Les dones que pateixen maltractament han conviscut amb l'agressor, com a mitjana, uns 14 anys, i han sofert maltractament durant uns 10 anys aproximadament. El tipus de violència més freqüent és la psicològica, seguida de la física i la sexual.

- ✓ Es detecta un **25% de prevalença del maltractament**.
- ✓ A Atenció primària es detecta un 25%, tant en grup intervenció com control.
- ✓ A atenció a la dona, es detecta un 33% en grup intervenció i 18% en grup control.
- ✓ Quan el professional i la dona no es coneixen les preguntes indirectes afavoreixen la detecció del problema.
- ✓ **La malaltia psiquiàtrica és més freqüent en les dones que han patit violència domèstica** (44% en el grup de maltractades, 16% en el grup sense maltractament), però apareix després del maltractament i no és causa d'aquesta.
- ✓ **El 78% de les dones maltractades deia tenir una bona relació amb la seva parella.**
- ✓ L'edat, nacionalitat, nivell d'estudis, situació laboral i hàbits tòxics de la dona no es relacionen amb el fet de rebre maltractament.
- ✓ **El tipus de violència més freqüent és la psicològica, seguida de la física, i la sexual.**
- ✓ La mitjana **d'anys de convivència amb l'agressor era de 14,3 anys**
- ✓ La duració de la **situació de violència domèstica era de 10 anys.**

Les autores de l'estudi conclouen que cal *"fer una bona detecció per ajudar a les víctimes a sortir del procés. Es necessari crear un clima adequat amb intimitat i assegurar la confidencialitat per tal que la dona expressi el problema sense por. És molt important preguntar, perquè si no es pregunta, no es detecta"*